

Examen d'Analyse
Durée : 1h30min
Toutes les réponses devront être justifiées

27 Mai 2016
SMPC2

Exercice 1 : (5 points)

1. Calculer la limite de la suite $U_n = \frac{1}{n\sqrt{n}} \sum_{k=0}^{n-1} \sqrt{k+n}$.
2. Calculer l'intégrale $I = \int_1^2 \frac{x-2}{(x-3)^2} dx$.
3. En déduire les valeurs de $J = \int_0^{\ln(2)} \frac{e^{2x} - 2e^x}{(e^x - 3)^2} dx$ et $K = \int_e^{e^2} \frac{\ln(x) - 2}{x(\ln(x) - 3)^2} dx$.

Exercice 2 : (5 points)

Soit f la fonction ainsi définie :

$$f(x) = \frac{\ln(x)}{a^2 + x^2}, \text{ avec } a > 0$$

1. Déterminer : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{3}{2}} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 0} x^{\frac{1}{2}} f(x)$.
2. En déduire que $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(x)}{a^2 + x^2} dx$ converge.
3. Montrer que $\int_0^1 \frac{\ln(x)}{1+x^2} dx = -\int_1^{+\infty} \frac{\ln(x)}{1+x^2} dx$. (Poser $x = \frac{1}{u}$)
4. Montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(x)}{a^2 + x^2} dx = \frac{\pi \ln(a)}{2a}$.

Exercice 3 : (5 points)

1. Résoudre l'équation différentielle du premier ordre :

$$(x^2 + 1)y' - xy = \sqrt{x^2 + 1}$$

2. Résoudre l'équation différentielle du second ordre :

$$y'' - 2y' + 10y = e^x + \sin(3x)$$

Exercice 4 : (5 points)

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

1. Montrer que f est continue sur \mathbb{R}^2 .
2. Calculer $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$, $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$, $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$, $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$.
3. f est-elle de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$? justifier votre réponse.
4. f est-elle de classe C^1 sur \mathbb{R}^2 ? justifier votre réponse.

Correction d'analyse SMPC
2015-2016.

Exercice 1:

$$1/ \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n\sqrt{n}} \sum_{k=0}^{n-1} \sqrt{k+n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \sqrt{\frac{k}{n} + 1}$$

on prend $a=0 \Rightarrow b=1$.

on a $b-a=1$

on considère la fonction $f(x) = \sqrt{x+1}$ définie sur $[0,1]$.

On a f est continue sur $[0,1]$. donc d'après les sommes de Riemann; $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \int_0^1 \sqrt{x+1} dx = \left[\frac{2}{3} (x+1)^{3/2} \right]_0^1$

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \frac{2}{3} (2\sqrt{2} - 1)}$$

$$2/ I = \int_1^2 \frac{x-2}{(x-3)^2} dx = \int_1^2 \frac{x-3}{(x-3)^2} + \frac{1}{(x-3)^2} dx = \int_1^2 \frac{1}{x-3} + \frac{1}{(x-3)^2} dx$$
$$= \left[\ln|x-3| - \frac{1}{x-3} \right]_1^2 = \frac{1}{2} - \ln(2).$$

$$\text{dnc } \boxed{I = \frac{1}{2} - \ln(2)}.$$

3/ on pose $t = e^x \Rightarrow dt = e^x dx$.

quand $x = 0 \Rightarrow t = 1$

$x = \ln(2) \Rightarrow t = 2$

$$J = \int_0^{\ln(2)} \frac{e^x - 2}{(e^x - 3)^2} e^x dx = \int_1^2 \frac{t-2}{(t-3)^2} dt = I$$

$$\text{dnc } \boxed{J = \frac{1}{2} - \ln(2)}$$

on pose $t = \ln x \Rightarrow dt = \frac{1}{x} dx$.

quand $x = e \Rightarrow t = 1$

$x = e^2 \Rightarrow t = 2$

$$K = \int_e^{e^2} \frac{\ln(x) - 2}{x(\ln x - 3)^2} dx = \int_1^2 \frac{t-2}{(t-3)^2} dt = I$$

$$\text{dnc } \boxed{K = \frac{1}{2} - \ln(2)}$$

Exercice 2:

$$f(x) = \frac{\ln x}{a^2 + x^2} \text{ avec } a > 0.$$
$$1/ \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{3}{2}} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{3}{2}} \frac{\ln x}{x^2 \left(\frac{a^2}{x^2} + 1 \right)}$$
$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x} \left(\frac{a^2}{x^2} + 1 \right)} = 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^{\frac{1}{2}} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{\frac{1}{2}} \ln x}{a^2 + x^2} = 0.$$

$$2/ \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{a^2 + x^2} dx = \int_0^1 \frac{\ln x}{a^2 + x^2} dx + \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{a^2 + x^2} dx.$$

en 0:

$$\text{On a } \lim_{x \rightarrow 0} x^{\frac{1}{2}} \frac{\ln x}{a^2 + x^2} = 0 \text{ dnc } \frac{\ln x}{a^2 + x^2} = o\left(\frac{1}{x^{\frac{1}{2}}}\right)$$

et comme $\int_0^1 \frac{1}{x^{\frac{1}{2}}} dx$ est convergente car $\frac{1}{2} < 1$.

dnc $\int_0^1 \frac{\ln x}{a^2 + x^2} dx$ est convergente.

en $+\infty$:

$$\text{On a : } \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{3}{2}} \frac{\ln x}{a^2 + x^2} = 0 \text{ dnc } \frac{\ln x}{a^2 + x^2} = o\left(\frac{1}{x^{\frac{3}{2}}}\right)$$

et comme $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{\frac{3}{2}}} dx$ est convergente car $\frac{3}{2} > 1$.

dnc $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{a^2 + x^2} dx$ est convergente.

Par conséquent $\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{a^2 + x^2} dx$ est convergente.

3/ On pose $x = \frac{1}{u} \Rightarrow dx = -\frac{1}{u^2} du$.

quand $x = 0 \Rightarrow u \rightarrow +\infty$

$x = 1 \Rightarrow u = 1$

$$\int_0^1 \frac{\ln x}{1 + x^2} dx = \int_{+\infty}^1 \frac{\ln\left(\frac{1}{u}\right)}{1 + \frac{1}{u^2}} \cdot \frac{-du}{u^2} = \int_1^{+\infty} \frac{-\ln(u)}{1 + u^2} du$$

$$\text{Donc } \int_0^1 \frac{\ln x}{1 + x^2} dx = - \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{1 + x^2} dx$$

$$4/ \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{a^2 + x^2} dx = \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{a^2 \left(1 + \left(\frac{x}{a}\right)^2\right)} dx.$$

on pose $t = \frac{x}{a} \Rightarrow dt = \frac{1}{a} dx$.
 quand $x \rightarrow 0 \Rightarrow t \rightarrow 0$
 $x \rightarrow +\infty \Rightarrow t \rightarrow +\infty$

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{a^2 + x^2} dx = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(at)}{a^2(1+t^2)} a dt$$

$$= \frac{1}{a} \int_0^{+\infty} \frac{\ln(a) + \ln(t)}{1+t^2} dt$$

$$= \frac{\ln(a)}{a} \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+t^2} dt + \frac{1}{a} \int_0^{+\infty} \frac{\ln(t)}{1+t^2} dt.$$

comme $\int_0^1 \frac{\ln x}{1+x^2} dx = - \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx$

$$\text{donc } \int_0^1 \frac{\ln x}{1+x^2} dx + \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx = 0$$

$$\text{donc } \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx = 0.$$

$$\text{donc } \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{a^2 + x^2} dx = \frac{\ln(a)}{a} \left[\text{Arctg}(t) \right]_0^{+\infty}$$

Par conséquent $\boxed{\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{a^2 + x^2} dx = \frac{\pi \ln(a)}{2a}}$

Exercice 3:

$$1/ (x^2+1)y' - xy = \sqrt{x^2+1}$$

$$1^{\text{ère}} \text{ étape: } (x^2+1)y' - xy = 0$$

$$(\Rightarrow) (x^2+1) \frac{dy}{dx} = xy$$

$$(\Rightarrow) \int \frac{dy}{y} = \int \frac{x}{x^2+1} dx$$

$$(\Rightarrow) \ln|y| = \frac{1}{2} \ln(x^2+1) + K.$$

$$(\Rightarrow) \boxed{y_0 = A\sqrt{x^2+1}; A \in \mathbb{R}}$$

2^{ème} étape: pour la méthode de la variation de la constante.

$$y_p = A(x)\sqrt{x^2+1}$$

$$y_p' = A'(x)\sqrt{x^2+1} + \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} A(x)$$

$$(x^2+1)y_p' - xy_p = \sqrt{x^2+1}$$

$$(x^2+1) \left[A'(x)\sqrt{x^2+1} + \frac{A(x)x}{\sqrt{x^2+1}} \right] - xA(x)\sqrt{x^2+1} = \sqrt{x^2+1}$$

$$(\sqrt{x^2+1})^{\frac{3}{2}} A'(x) + A(x)x\sqrt{x^2+1} - xA(x)\sqrt{x^2+1} = \sqrt{x^2+1}$$

$$A'(x) = \frac{1}{x^2+1} \Rightarrow A(x) = \text{Arctg} x + C.$$

$$\text{Donc } \boxed{y_p = (\text{Arctg}(x) + C)\sqrt{x^2+1}; C \in \mathbb{R}}$$

La solution générale est:

$$y_g = y_0 + y_p = A\sqrt{x^2+1} + C\sqrt{x^2+1} + \text{Arctg}(x)\sqrt{x^2+1}$$

$A, C \in \mathbb{R}$

$$\text{Donc } \boxed{y_g = (\lambda + \text{Arctg}(x))\sqrt{x^2+1}; \lambda \in \mathbb{R}}$$

$$2/ y'' - 2y' + 10y = e^x + \sin(3x)$$

$$1^{\text{ère}} \text{ étape: } y'' - 2y' + 10y = 0$$

$$(EC): r^2 - 2r + 10 = 0$$

$$\Delta = 4 - 40 = -36 = (6i)^2$$

$$r_1 = \frac{2+6i}{2} = 1+3i$$

$$r_2 = \frac{2-6i}{2} = 1-3i$$

$$\text{dnc } y_0 = e^x (\lambda_1 \cos(3x) + \lambda_2 \sin(3x))$$

$$\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}.$$

$$2^{\text{ème}} \text{ étape: } y'' - 2y' + 10y = e^x$$

comme 1 n'est pas racine de EC

$$\text{dnc } y_{p1} = Ae^x; y'_{p1} = Ae^x \text{ et } y''_{p1} = Ae^x$$

$$Ae^x - 2Ae^x + 10Ae^x = e^x \Leftrightarrow 9A = 1 \Leftrightarrow A = \frac{1}{9}$$

$$\text{dnc } y_{p1} = \frac{1}{9} e^x$$

$$3^{\text{ème}} \text{ étape: } y'' - 2y' + 10y = \sin(3x)$$

comme 3i n'est pas racine de (EC)

$$\text{dnc } y_{p2} = A \cos(3x) + B \sin(3x)$$

$$y'_{p2} = -3A \sin(3x) + 3B \cos(3x)$$

$$y''_{p2} = -9A \cos(3x) - 9B \sin(3x)$$

$$-9A \cos(3x) - 9B \sin(3x) + 6A \sin(3x) - 6B \cos(3x) + 10A \cos(3x) + 10B \sin(3x) = \sin(3x)$$

$$(A - 6B) \cos(3x) + (B + 6A) \sin(3x) = \sin(3x)$$

$$\begin{cases} A - 6B = 0 \\ 6A + B = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 6B \\ 37B = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B = \frac{1}{37} \\ A = \frac{6}{37} \end{cases}$$

$$\text{dnc } y_{p2} = \frac{6}{37} \cos(3x) + \frac{1}{37} \sin(3x)$$

La solution générale est:

$$y_a = e^x (\lambda_1 \cos(3x) + \lambda_2 \sin(3x)) + \frac{1}{9} e^x + \frac{6}{37} \cos(3x) + \frac{1}{37} \sin(3x)$$

$$\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}.$$

Exercice 4 :

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

1/ on a: f est continue sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$
comme produit de fonctions continues sur
 $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$.

en $(0,0)$: on a: $|x| \leq \sqrt{x^2 + y^2} \Rightarrow x^2 \leq x^2 + y^2$
 $|y| \leq \sqrt{x^2 + y^2}$

dnc $\left| \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} \right| \leq \frac{(x^2 + y^2) \sqrt{x^2 + y^2}}{x^2 + y^2} = \sqrt{x^2 + y^2} \xrightarrow{(x,y) \rightarrow (0,0)} 0$

dnc $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0 = f(0,0)$.

dnc f est continue en $(0,0)$.

D'où: f est continue sur \mathbb{R}^2 .

2/ $\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \frac{2xy(x^2 + y^2) - x^2 y(2x)}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{2xy^3}{(x^2 + y^2)^2}$

dnc $\boxed{\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \frac{2xy^3}{(x^2 + y^2)^2}}$

$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = \frac{x^2(x^2 + y^2) - x^2 y(2y)}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{x^4 + x^2 y^2 - 2x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^2}$

dnc $\boxed{\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = \frac{x^4 - x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^2}}$

$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h,0) - f(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{h} = 0$.

dnc $\boxed{\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = 0}$

$\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(0,k) - f(0,0)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{k} = 0$.

dnc $\boxed{\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 0}$.

3/ f est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$
en tant qu'une fraction rationnelle
ayant un dénominateur non nul

$$\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}.$$

dnc f est de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$.

4/ en $(0,0)$:

on considère le chemin $(x,y) = (x,x)$.

$$\lim_{(x,x) \rightarrow (0,0)} \frac{2x^4}{(2x^2)^2} = \lim_{(x,x) \rightarrow (0,0)} \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

on considère le chemin $(x,y) = (0,y)$

$$\lim_{(0,y) \rightarrow (0,0)} \frac{0}{y^2} = 0 \neq \frac{1}{2}.$$

dnc $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\partial f}{\partial x}(x,y)$ n'existe pas.

$$\text{dnc } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\partial f}{\partial x}(x,y) \neq \frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = 0.$$

dnc $\frac{\partial f}{\partial x}$ n'est pas continue en $(0,0)$.

dnc f n'est pas de classe C^1 en $(0,0)$.

dnc f n'est pas de classe C^1 sur \mathbb{R}^2 .